

럼피스킨 백신접종 후 반응 발생사례 안내

□ (안전성) LSD는 인수공통전염병이 아니며 백신접종 가축의 고기나 우유는 먹어도 안전

* 럼피스킨병 백신의 휴약기간은 별도로 없으며, 광범위하게 LSD 백신을 사용하고 있는 유럽에서도 별도로 휴약기간을 정하고 있지 않음

□ (발현성) LSD 백신은 약독화 생백신으로 접종 후 경미한 접종 반응이 나타날 수 있으나, 대부분 접종 후 2~3주 이내 소멸

○ 다만, 개체별로 과민반응(쇼크 등)이나 접종과정 중 물리적 요인으로 부상 등 우려가 있어 주의 필요

* 금번 긴급백신 접종으로 인해 소가 죽거나 부상당한 경우 보상 가능(가전법 48조)



* 니슬링 반응(Neethling reaction) : 안면부와 목 등 백신접종 부위 인근에 0.5~2cm의 결절이 나타나며 부분적인 염증과 발열이 나타날 수 있음(2~3주 이내 소멸)

※ (해외사례) 크로아티아(럼피스킨 비발생국)의 백신접종 가축(0.09%)과 백신접종 농장(0.19%)에서 미미한 접종 반응 확인

참고

럼피스킨 백신접종 후 반응(럼피스킨 감별진단 도감)

(한우) `23.11.21일 경북 예천 ○농장



목



회음부

(젖소) `23.11.8일 전북 정읍 □농장



어깨



복부 및 몸통



둔부



둔부, 회음부